

## Bästa patient

Du har nu börjat behandlas med PRADAXA® (dabigatranetexilat). För att kunna använda PRADAXA® på ett säkert sätt bör du läsa den viktiga informationen som finns i det här informationskortet.

Detta informationskort innehåller viktig information om din behandling. Bär därför alltid med dig det. Informera vårdpersonal om att du använder PRADAXA®.

CV-16-40



## PATIENT- INFORMATIONSKORT

# PRADAXA®

(dabigatranetexilat)

- Bär alltid med dig detta patientinformationskort
- Se till att det är den senaste versionen

UPPDATERAD JANUARI 2016

## Information om PRADAXA® för patienter

- Följ din läkares anvisningar när du tar PRADAXA®.
- PRADAXA® gör blodet mindre "klibbigt", motverkar bildandet av blodproppar och minskar risken för att du ska drabbas av en stroke eller andra komplikationer.
- Det innebär dock att blödningsrisken kan öka.
- Om du börjar blöda och det inte slutar av sig självt ska du genast ta kontakt med din läkare.
- Om du börjar blöda ska du kontakta din läkare innan du slutar att ta PRADAXA®.
- Om du ramlar eller skadar dig under behandlingen, framför allt om du skadar huvudet, kontakta genast din läkare. Din läkare kan behöva undersöka dig eftersom du kan vara i riskzonen för att få blödning.
- Tecken och symtom på att blödning förekommer kan vara blåmärken, svart avföring, blod i urinen, näsblod m.m.
- Om du måste genomgå en operation eller andra ingrepp ska du berätta för den behandlande läkaren att du tar PRADAXA® innan ingreppet.
- Sluta inte att ta PRADAXA® utan att först prata med din läkare.
- Ta PRADAXA® regelbundet enligt anvisningarna och se till att du inte glömmar att ta någon dos.
- Informera din läkare om alla läkemedel som du använder.

- PRADAXA® kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel och med ett glas vatten, för att se till att kapseln hamnar i magen. Du ska inte ha sönder eller tugga kapseln och inte tömma kapseln på korn eftersom det kan öka risken för blödning.

## Information om PRADAXA® för vårdpersonal

- PRADAXA® (dabigatranetexilat) är ett oralt antikoagulantium som verkar direkt trombinhämmande.
- Om patienten måste genomgå en operation eller annat ingrepp ska behandlingen med PRADAXA® avbrytas innan dess (för detaljer se produktresumén).
- Om en allvarlig blödning uppstår måste behandlingen med PRADAXA® avbrytas omedelbart.
- Eftersom PRADAXA® huvudsakligen utsöndras via njurarna är det viktigt att upprätthålla adekvat diures. PRADAXA® kan dialyseras.
- Ett specifikt reverserande läkemedel PRAXBIND® (idarucizumab) finns tillgängligt (för detaljer och ytterligare råd om att reversera den antikoagulatoriska effekten hos PRADAXA®, se produktresumén).

## Patientinformation

Patientens namn

Födelsedatum

Indikation för antikoagulation

Dosering av PRADAXA®

Fyll i denna del eller be din läkare att göra det